

Suicide en de psychiater

Voorjaarssymposium FMG
'suicide?'



12 mei 2017

REMCO DE WINTER

WWW.SUICIDALITEIT.NL



Parnassia Groep



No Conflict of Interest



Inhoud



- Wie en waar?
 - vragen
 - Uit de praktijk
 - Cijfers Nederlandse situatie internationale vergelijking
 - Registratie
 - Definities suïcidaal gedrag en epidemiologie
 - Hoe betrouwbaar zijn de cijfers.... (aftrap)
 - afronding
-
- Casus 2

Wie ben ik, persoonlijk doel!




- Wie is dat mens.....



- Meer samenwerking tussen psychiater en forensisch geneeskundige!

Zwaar onderwerp



Afwisselend vragen.....



Professionele taal.....



- A) Zelfmoord
- B) Suïcide of zelfdoding

Professionele taal.....



- A) Zelfmoord
- **B) Suicide of zelfdoding**

Hoeveel suïcides zijn er de laatste 5 jaar, per jaar in Nederland



- A) Minder dan 1750
- B) Meer dan 1750

Hoeveel suïcides zijn er de laatste 5 jaar, per jaar in Nederland

- A) Minder dan 1750

- **B) Meer dan 1750**



Zijn er meer verkeersdoden dan suïcides?

- A) Ja
- B) Nee



Zijn er meer verkeersdoden dan suïcides?

- A) Ja
- **B) Nee**



Uit de praktijk



Casus I



- Vrouw 53 jaar
- “Echtgenoot” in verpleeghuis
- Opgenomen ivm suïcidaal gedrag
- Gezond, gaat op weekendverlof

- Volgende dag dood.....


- > Natuurlijke dood (eenzijdige pneumonie).....
- Beloop.....
- Nabespreking bij de huisarts

Cijfers







Suicide cijfer in Nederland



Suicide in Nederland, man/vrouw



Aantallen in 2015



Nederland: > 1950 “Totalen” leeftijdsgroepen



Aantal suïcides over 65 jaar in Nederland: 1950-2014 onder jongeren t.o.v volwassenen
(CBS 2015, de Winter)

	0-10 jaar	10-15	15-20	>20 jaar
Totaal	9 (2:1)	322 (4.3:1)	1956 (2.7:1)	80.481 (1.9:1)
Mannelijk	6	274	1434	52.496
vrouwelijk	3	63	522	27.985

‘Onder jongeren tussen 20 en 25 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1’

Later meer uitleg



Nabestaanden Luciano Ligthart zien twijfels over zelfdoding groeien

10 mei 2017, 10:18 Nieuwslabels: [Den Haag](#), [Luciano Ligthart](#) Door Redactie
Categorie: [Nieuws](#)

De nabestaanden van de veertienjarige Luciano Ligthart zeggen na inzage van onderzoeks dossier en een gesprek met een arts ernstig te twijfelen aan de conclusie van zelfdoding. De jongen kwam vorig jaar juni om het leven in een instelling op de V



"Nu blijkt er opeens dat er onverklaarde striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksel zaten", zeggen zijn nabestaanden. Ligthart en zijn moeder na raadpleging van het dossier worden ondersteund door forensisch-patholoog Frank van der Vliet die zich eveneens in de zaak heeft verdiept en aandringsreconstructie. Volgens de patholoog lijkt de lezing dat de jongen met een dekbedhoes aan een gordijnrail heeft verhangen. Het is een moeilijk uitvoerbaar. "Ik wil graag de situatie nabootsen om te zien of er genoeg reden om er nog eens naar te kijken."

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, heeft Van de Goot ingevraagd nader onderzoek te verrichten naar het overlijden. "De nabestaanden willen ons antwoord op de vraag hoe de striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksels zijn ontstaan of er kort voor zijn dood geweld op hem is toegepast."

Beleid schoot tekort

De Inspecties van Jeunzorg en Gezondheidszorg constateerden dit voorjaar d




▲ © ANP, inzet Anass

Familie Anass weet zeker dat hij is vermoord


De 13-jarige Anass Aouragh stuurde op woensdagmiddag 6 februari, enkele uren voordat hij als vermist werd opgegeven, drie e-mails naar zijn docenten. Daarin vroeg hij om extra lessen, omdat hij graag voldoende wil halen. 'Zoiets doe je niet als je van plan bent zelfmoord te plegen', zegt Anass' halfzuster Yasmin (19)

Doden door suïcide & verkeer

1970 - 2015



Suicide Europa




Bron: OECD

1) 2011


2) 2010

**NUMBER OF SUICIDES PER
100,000 PEOPLE PER YEAR**
(Age-adjusted; data by WHO, 2012)




**MALE SUICIDES TO FEMALE
SUICIDES RATIO**

(Age-adjusted; data by WHO, 2012)



Age-standardized suicide rates (per 100 000 population), both sexes, 2012



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Health Statistics and
Information Systems (HSI)
World Health Organization



© WHO 2014. All rights reserved.

Registratie



Definitie betrouwbare registratie



Indien Sterfte- Oorzaak Onbepaald (SOO)?

- A) Minder dan 30%
- B) Minder dan 20%

Definitie betrouwbare registratie



Indien Sterfte- Oorzaak Onbepaald (SOO)?

- A) Minder dan 30%
- **B) Minder dan 20%**

Is de registratie van suïcides in Nederland beter dan in Egypte?

- A) Ja
- B) Nee



Is de registratie van suïcides in Nederland beter dan in Egypte?

- **A) Ja**
- **B) Nee**





Als psychiater kan je
ook nooit eens een
grapje maken.



Is de registratie van suïcides in Nederland beter dan in Egypte?

- A) Ja

- **B) Nee!**



Suicide en onbekende doodsoorzaak

- Grote verschillen registraties per land
- Egypte o.....?
- Suriname en..... Declaratie
- Grote verschillen opvatting over suicide
 - Eer (harakiri/ Seppuku)
 - Religie > misdaad

HOME » NEWS » WORLD NEWS » AFRICA AND INDIAN OCEAN » EGYPT

Co-pilot 'crashed EgyptAir jumbo as act of revenge

By David Wastell
12:01AM GMT 17 Mar 2002

THE co-pilot of EgyptAir Flight 990, which crashed off New England killing 217 people in 1999, brought the plane down as an act of revenge after being told that he would be no longer allowed to fly transatlantic routes, according to a senior colleague.

Former EgyptAir Capt Taha Mahmoud Hamdy, one of about 50 EgyptAir crew members summoned to a meeting in Cairo after the crash, said that the plane was deliberately put into a nosedive by Gamil al-Batouti after he had been reprimanded for sexual misconduct that embarrassed the company.

Capt Hamdy said that Batouti had been told just before the New York to Cairo flight took off that he would no longer be allowed to fly the lucrative and prestigious transatlantic routes because of a series of allegations which included exposing himself to teenage girls and propositioning hotel maids and guests.

Capt Hatem Rushdy, the chief of EgyptAir's 767 groups who was a passenger on the flight that day, had told Batouti before take-off: "This is your last flight," Capt Hamdy said. "Batouti's attitude was, 'This is the last flight for you, too!'"

Capt Hamdy's revelations, published yesterday in the Los Angeles Times, came shortly before a final federal report into the crash is due to be published this week. The report concludes that the jumbo jet was deliberately crashed by the veteran co-pilot, aged 59, but stops short of giving a reason for his act.

Related Articles

The report describes how Batouti took control of the plane 33,000ft over the Atlantic after insisting that a junior colleague leave the cockpit before his scheduled time to go off duty and waiting until another pilot went to the lavatory.

A National Transportation Safety Board transcript of the cockpit voice recorder reveals Batouti uttering what sounded like a prayer, "I rely on God", before putting the plane into its dive.

EXTERNAL

Egypt Air

EgyptAir '99 jet cr...
[14 Mar '02] - Los

Relative of EgyptAir '02] - Los

Aviation: National Safety Board in Egypt

Inside t

Weird a selfies

Shipwre

Betrouwbaarheid registratie



- verhouding van “de Sterfte- Oorzaak Onbepaald (SOO)” (<20%)
- Nederland SOO relatief klein aandeel vh totale aantal overledenen
- Klein effect op aantal vals negatieve suïcides.
- Suïcidecijfer van een land
 - Eerder een onderschatting dan een overschatting
- Nederland behoort tot de betere registerende landen

Nederland



Bij ongeveer 98,5 % overledenen registratie van een “duidelijke” doodsoorzaakverklaring.

Indien niet > registratie “Overige slecht omschreven en niet gespecificeerde oorzaken van sterfte”

= SOO

De doodsoorzakenstatistiek van het CBS heeft helaas een beperkte betrouwbaarheid. De gegevens berusten nu eenmaal noodgedwongen op de (vaak onvolledige) gegevens die moeten worden aangeleverd door de behandelend arts. In gevallen waarin geen gegevens worden ontvangen werden deze overlijdensgevallen nog wel als zodanig geregistreerd door de koppeling met de gegevens in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). De GBA is in 2014 vervangen door de BRP (BasisRegistratie Personen). De gemeente van overlijden, waar het Verlof tot lijkbezorging moet worden afgegeven, is niet noodzakelijk ook de gemeente van inschrijving in de GBA of nieuwe BRP. De medisch ambtenaar van het



Availability and quality of cause-of-death data: injuries

Kavi Bhalla, James E Harrison, Saeid Shahraz, Lois A Fingerhut Expert Group

Volume 88, Number 11, November 2010, 831-838C

Region ^a	Reliable estimates of deaths due to all external causes of injury (n = 20)	Reliable estimates of deaths due to road injury (n = 47)	Reliable estimates of deaths due to suicide or homicide (n = 60)
Asia Pacific, high-income countries	Japan, Republic of Korea	Japan, Republic of Korea	Japan, Republic of Korea
Central Asia	Uzbekistan	Kyrgyzstan, Uzbekistan	Kyrgyzstan, Uzbekistan
East Asia	China, Hong Kong SAR	China, Hong Kong SAR	China, Hong Kong SAR
South-East Asia		Mauritius	Mauritius
Australasia	Australia, New Zealand	Australia, New Zealand	Australia, New Zealand
Caribbean	Barbados, Trinidad and Tobago	Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Guyana, Saint Lucia, Trinidad and Tobago	Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Guyana, Martinique, Saint Lucia, Trinidad and Tobago
Central Europe	Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia	Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia	Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia
Eastern Europe	Estonia, Lithuania	Estonia, Latvia, Lithuania, the Republic of Moldova	Estonia, Latvia, Lithuania, the Republic of Moldova
Western Europe	Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta	Austria, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain	Austria, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom
Latin America – Andean countries			Ecuador
Central Latin America	Panama	Colombia, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Panama	Colombia, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Panama
Southern Latin America		Chile	Argentina, Chile, Uruguay
Tropical Latin America		Brazil, Paraguay	Brazil, Paraguay
North Africa and the Middle East		Kuwait	Kuwait
North America, high income		Canada, United States of America	Canada, United States of America

SAR, Special Administrative Region.

^a Data on a particular external cause of death were listed as reliable if no more than 20% of deaths attributed to any partially specified category. For example, deaths due to road injury can be reliably estimated if no more than 20% of deaths were attributed to the following categories: unknown cause of death (International Classification of Diseases, 10th revision codes, R95–R99); injury death of unspecified mechanism; injury death of unspecified injury of unspecified mechanism; and death due to unintentional transport injury of a death due to suicide or homicide can be reliably estimated if no more than 20% of deaths were attributed to unknown cause of death (International Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision codes, R95–R99); injury death of unspecified mechanism; and injury death of undetermined intent.

^b Countries were grouped into the 21 global regions defined by the 2005 Global Burden of Disease Study (an error occurred while processing this directive).

Hoeveel % verkeer geregistreerd



Nabestaanden Luciano Ligthart zien twijfels over zelfdoding groeien

10 mei 2017, 10:18 Nieuwslabels: [Den Haag](#), [Luciano Ligthart](#) Door Redactie
Categorie: [Nieuws](#)

De nabestaanden van de veertienjarige Luciano Ligthart zeggen na inzage van het onderzoeksdossier en een gesprek met een arts ernstig te twijfelen aan de conclusie van zelfdoding. De jongen kwam vorig jaar juni om het leven in een instelling op de Veluwe.



"Nu blijkt er opeens dat er onverklaarde striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksel zaten", zeggen zijn zus Natascha Ligthart en zijn moeder na raadpleging van het dossier. Hun twijfels worden ondersteund door forensisch-patholoog Frank van de Goot, die zich eveneens in de zaak heeft verdiept en aandringt op een reconstructie. Volgens de patholoog lijkt de lezing dat Luciano met een dekbedhoes aan een gordijnrail heeft verhangen niet zo moeilijk uitvoerbaar. "Ik wil graag de situatie nabootsen om genoeg reden om er nog eens naar te kijken."

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, heeft Van de Goot ingevraagd nader onderzoek te verrichten naar het overlijden. "De nabestaanden willen ondanks het antwoord op de vraag hoe de striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksels zijn ontstaan of er kort voor zijn dood geweld op hem is toegepast."

Beleid schoot tekort

De Inspecties van Jeugdzorg en Gezondheidszorg constateerden dit voorjaar dat



▲ © ANP, inzet Anass

Familie Anass weet zeker dat hij is vermoord

De 13-jarige Anass Aouragh stuurde op woensdagmiddag 6 februari, enkele uren voordat hij als vermist werd opgegeven, drie e-mails naar zijn docenten. Daarin vroeg hij om extra lessen, omdat hij graag voldoende wil halen. 'Zoiets doe je niet als je van plan bent zelfmoord te plegen', zegt Anass' halfzuster Yasmin (19)

Definities suïcidaal gedrag en epidemiologie



Hoe vaak per jaar (NI)



- **Wat is juist?**
- A) Ongeveer 2.5 % vd mensen heeft suïcidale gedachten
- B) 0.01% vd mensen sterft aan suïcide

Hoe vaak per jaar (NI)



- Wat is juist? Allebei
- **A) Ongeveer 2.5 % vd mensen heeft suïcidale gedachten**
- **B) Ongeveer 0.01% vd mensen sterft door suïcide**

Definitie




- **Suïcidaal gedrag**

- verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden. De term 'gedrag' verwijst naar zowel handelingen als naar gedachten.

- **Hiërarchie**

- Gedachten
- Intenties/plan
- Pogingen
- Suïcide

Jaar prevalentie suïcidaal gedrag



Gevaarlijk gedrag en sterven....



- <https://www.youtube.com/watch?v=QjcPO5TxkZ8>

Nee!

- Niet > de intentie om te sterven!

Handreiking

(Niet-)natuurlijke dood

Wat moet u weten, wat moet u doen?

Versie 1.0., januari 2016

OPENBAAR MINISTERIE



Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Forensisch Medisch Genootschap
Nederlandsche Vereniging voor Forensische Geneeskunde

knmg
voor verantwoorde
medische zorg

Inhoud

Samenvatting	2	4	Complicaties en calamiteiten	6
1 Inleiding	3	4.1	Complicatie	6
2 Wet op de lijkbezorging; algemeen	3	4.2	Calamiteit	7
2.1 Constateren van de dood	3	4.3	Verhouding calamiteit – niet-natuurlijke dood	7
2.2 Lijkschouw	3	5	Bijzondere overlijdenssituaties	8
2.3 Verklaring van (natuurlijk) overlijden	4	5.1	Overlijden in detentie of bij gedwongen/bijzondere opname	8
2.4 Inschakelen gemeentelijk lijkschouwer	4	5.2	Overlijden in Bopz-instelling	8
2.5 (Niet-)natuurlijk overlijden	4	5.3	Overlijden na hulp bij zelfdoding of euthanasie	8
3 Rol van de arts bij overlijden	5	5.4	Overlijden van minderjarigen	8
3.1 Lijkschouw door de behandelend arts	5	6	Werkwijze externe organisaties	8
3.2 Overtuigd van natuurlijke dood	5	6.1	Werkwijze politie rond een niet-natuurlijke dood in de zorg	8
3.3 Geen overtuiging van natuurlijke dood	6	6.2	OM: beslissing(en) officier van justitie	9
3.4 Schouw door de gemeentelijk lijkschouwer	6	6.3	Werkwijze IGZ	9
3.5 Wat te doen als achteraf de overtuiging van natuurlijk overlijden wegvalt?	6	Definities		10
		Afkortingen		11

5.3 Overlijden na hulp bij zelfdoding of euthanasie

Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelend arts geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijk lijkschouwer of één der gemeentelijk lijkschouwers.

Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Uit de aard van de wettelijke regeling vloeit voort dat de behandelend arts enige (relevante) informatie aan de gemeentelijk

Wat is juist?



Suicide komt 10 keer vaker voor dan moord?

- A) Juist?
- B) Onjuist?

Wat is juist?



Suicide komt 10 keer vaker voor dan moord?

- A) Juist?
- **B) Onjuist?**

Suicide 2^e niet natuurlijke doodsoorzaak



Niet-natuurlijke doodsoorzaken (2015)

Totaal	7253	100%
Accidentele val	3486	48.1%
<u>Suicide</u>	<u>1871</u>	<u>25.8%</u>
Vervoersongevallen (3x)	631	8.7%
Overige ongevallen	255	3.5%
Accidentele vergiftiging	166	2.3%
Moord en doodslag (18x)	104	1.4%
Accidentele verdrinking	83	1.1%
Gebeurtenissen opzet onbekend	34	0.5%
Overige (verbranden, stikken door dieren etc.)	623	8.6%

Sucide & methode



Suicide en methode	%
Totaal	100%
Verhanging	40.4%
Medicatie/alcohol/drugs	18.2%
Voor een railvoertuig	10.7%
Springen van hoogte	7.7%
Verdrinken	7.1%
Vuurwapen	5.5%
Plastic zak (helium?)	5.6%
Rest	4.7%

Methoden onder pogers (crisisdienst) (de Winter e.a. 2017)



TABEL 3 Methodes van pogingen bij suïcidale patiënten

Methoden	Suïcidaal	
	n	%
Totaal	1364	100%
Medicatie	696	51,0%
Snijden	143	10,5%
Ophanging	107	7,8%
Gerelateerd aan railvoertuig/verkeer	53	3,9%
Van hoogte springen	41	3,0%
Verdrinken	30	2,2%
Diverse (asfyxie, vuurwapen, auto, geforceerd ongeval etc.)	118	8,7%
Vergiftiging	40	2,9%
Onbekend, invulfout	136	10,07%

Bij suïcide “ergens” in behandeling bij GGZ?

- A) Ongeveer 40%
- B) Ongeveer 65%

Bij suïcide “ergens” in behandeling bij GGZ?

- **A) Ongeveer 40%**
- B) Ongeveer 65%

Tijd.....10.10?



- Inkorten??
- Of sneller.....



Suïcidaal gedrag



- **Suïcide is zeldzaam!**
- Suïcide te laat voor een hulpverlener en zeker de GGz?
 - Forensisch arts.....
- Suïcidaal gedrag ernstig > GGz

Tijdens suicide bekend in de GGZ?

- **< 40%**

- 70% ooit

Als wij ze zien leven ze nog!



Suicide in GGz



- Gehele populatie: $\approx 11/100.000$
- GGz Populatie: $\approx 80-90/100.000$
- “Algemene” populatie: $\approx 6-7/100.000$

Euthanasie



- **Natuurlijke dood**
- Ongeveer 4000 maal per jaar!

- 2015: 56 patiënten met primair een psychiatrische stoornis
 - Ongeveer 9% vd verzoeken bij de SLK
 - Daarvoor al selectie door psychiater

Oorzaken.....



Belangrijkste voorspeller suïcide?




- Ernstig depressief?
- Eerdere suïcidepoging?

Belangrijkste voorspeller suïcide?




- Ernstig depressief?
- **Eerdere suïcidepoging?**

Stress, kwetsbaarheid en entrapment



• Risicofactoren



Slechts 2 diagnoses < suïcidaal gedrag



- Classificatie DSM....

-

-

Beschermende factoren



beschikbaarheid





There is a place for me somewhere out there

Zelfmoordmethoden

Een zelfmoordmethode is een manier waarop een persoon zijn of haar eigen leven opzettelijk beëindigd. Deze methoden kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: fysische en chemische methoden. Fysische methoden vernietigen 1 of meerdere essentiële onderdelen van biologische of het centrale zenuwstelsel. Chemische methoden richten zich op het onderbreken van biologische belangrijke processen, zoals cellulaire ademhalen of diffusie capaciteit. Chemische methoden zijn op het eerste gezicht niet zichtbaar, terwijl fysische methoden direct bewijs leveren dat iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan.

Bloedingen

Leegbloeden is het fatale proces van hypovolemie (bloedverlies) tot een niveau dat voldoende is om de dood als gevolg te hebben. Meestal wordt dit veroorzaakt door schade toe te brengen aan de slagaders. Mensen die een zelfmoordpoging overwegen, of het wapen willen uitproberen om de doeltreffendheid er van vast te stellen. Meestal wordt dit veroorzaakt door schade toe te brengen aan de aangereid als 'aartzelingswonden' of 'voorlopige wonden'. Deze sneden zijn meestal niet dodelijk en parallel aan elkaar. Soms worden de polsen gesneden met als doel automutilatie, en niet zelfmoord. Als deze wonden echter niet behandeld worden, en eigenlijk te diep zijn, kan dit leiden tot hartritmestoornissen, met de dood als gevolg. Een mistukte poging kan als gevolg hebben tot

Gebruik een scherp mes en snijd schuin en diep in de binnenkant van je polsen...
Als het bloed er echt uitspuit heb je de juiste ader geraakt en is redding niet meer mogelijk als er niet direkt word ingegrepen!

Hoe denken en dergelijke eigen over zelfdoding?? Ofwel; wat denkt het 'geloof' er eigenlijk van?!

Kaliumcyanide Zelfmoord Middel Bij Depressieve Mensen?

Posted in [zelfmoord](#) | No comments

Wat is kaliumcyanide?

Kaliumcyanide is een dodelijk zout dat sterk op suiker lijkt en heel goed oplost in water. Deze stof wordt voornamelijk gebruikt om insecten te doden en om metaal te behandelen en galvaniseren. Ook in de goudsector wordt het gebruikt om ertsen te onttrekken. Vaak ruikt kaliumcyanide naar amandelen maar dit hangt af van jouw geurcapaciteit. Velen kunnen kalium cyanide zelfs niet ruiken, wat het nog zo gevaarlijk maakt!

Waarom wordt deze stof vaak gebruikt bij zelfmoorden?

De grootste reden waarom **kaliumcyanide zelfmoord** kan veroorzaken is doordat het extreem giftig is en snel werkt, heel snel. Bij inname van een halve gram ben je na 20 seconden buiten bewustzijn en reeds in een coma. Na 30-45 minuten sluiten je hersenen zich af door een zuurstoftekort en ben je reeds overleden, geheel pijnloos. Just omdat het zo snel werkt, een kleine dosis nodig is en pijnloos verloopt is het zo aantrekkelijk. Je polsen opensnijden en 20 minuten kermen van de pijn is minder aantrekkelijk... Ook slaappillen nemen in combinatie met alcohol en andere verdovingsmiddelen werken trager en kunnen mistukken met maagbloedingen als gevolg...



Recent Posts

- [Waar Kan ik Kaliumcyanide Bestellen?](#)
- [Kaliumcyanide kopen](#)
- [Kaliumcyanide vergiftiging](#)
- [Kaliumcyanide Zelfmoord Middel Bij Depressieve Mensen?](#)

Categories

- [kaliumcyanide](#)
- [zelfmoord](#)

Tags

[kaliumcyanide](#) [kaliumcyanide bestellen](#) [kaliumcyanide kopen](#) [kaliumcyanide vergiftiging](#) [kaliumcyanide online](#) [kaliumcyanide bestellen online](#) [kaliumcyanide waar](#) [kaliumcyanide bestellen waar](#) [kaliumcyanide waar kan ik kaliumcyanide kopen](#)

- [Homepagina](#)
- [Zelfmoordmethoden](#)
- [Bleedingen](#)
- [Gebruik een scherp mes en snijd schuin en diep in de binnenkant van je polsen...](#)
- [Als het bloed er echt uitspuit heb je de juiste ader geraakt en is redding niet meer mogelijk als er niet direkt word ingegrepen!](#)
- [Hoe denken en dergelijke eigen over zelfdoding?? Ofwel; wat denkt het 'geloof' er eigenlijk van?!](#)
- [Kaliumcyanide Zelfmoord Middel Bij Depressieve Mensen?](#)
- [Wat is kaliumcyanide?](#)
- [Waarom wordt deze stof vaak gebruikt bij zelfmoorden?](#)
- [Waar Kan ik Kaliumcyanide Bestellen?](#)
- [Kaliumcyanide kopen](#)
- [Kaliumcyanide vergiftiging](#)
- [Kaliumcyanide Zelfmoord Middel Bij Depressieve Mensen?](#)
- [Categories](#)
- [Tags](#)

Doorzoek de website Zoeken

Contact
What About Suicide

- Kooistra pleegde zelfmoord
- Meisje (6) pleegt zelfmoord
- Meisjes doen zelfmoordpoging

- Christelijke kijk
- Christiananswers.net



- Woza
- Wanneer breekt je...

- De zee in

Suïcidaal gedrag altijd hetzelfde.....?

- 70-90% psychiatrische ziekte
- 10-30% niet.....

- Depressie
- Psychose
- Middelen
- Aanpassingsstoornis
- Persoonlijke diagnose
- etc...



Metafoor?



- Vergelijking met koorts?
- Verschillende oorzaken
 - Infectie
 - ✦ Bacteriel
 - ✦ Viraal
 - ✦ schimmel
 - Kanker
 - Allergie
 - Auto-immunziekte
 - Middelen
 - Onbekend



Primair depressief

- *Depressie*
- Stressgevoeligheid ↑↑
meestal langdurig

- **GGZ/“Samenleving”**

Verstoorde waarneming

- *Psychotisch(e) (depressie)*
- *Wegvallen realiteitszin*
kortdurend

- **GGZ/** *“samenleving”*

Ruminering

Psychosociale “draaikolk”

- *Ernstige verlieservaring*
- *Depressieve gedachten*
- **“Samenleving”/GGZ**

Communicatie

- *Conditionering*
- *Psychologische pijn*
- *Entrapment hulpverleners*
- **Samenleving/GGZ** ↔ *Samenleving/GGZ*

Problemen bij inventarisatie suïcide



- Andere doodsoorzaak registreren dan een suïcide?
- Aannemen dat een misdaad een suïcide is?
- Aannemen dat de suïcide een misdaad is ?

Nogal
wiedes

Suicide of another death cause?



Nabestaanden Luciano Ligthart zien twijfels over zelfdoding groeien

10 mei 2017, 10:18 Nieuwslabels: [Den Haag](#), [Luciano Ligthart](#) Door Redactie
Categorie: [Nieuws](#)

De nabestaanden van de veertienjarige Luciano Ligthart zeggen na inzage van onderzoeks dossier en een gesprek met een arts ernstig te twijfelen aan de conclusie van zelfdoding. De jongen kwam vorig jaar juni om het leven in een instelling op de V



"Nu blijkt er opeens dat er onverklaarde striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksel zaten", zeggen zijn nabestaanden. Ligthart en zijn moeder na raadpleging van het dossier worden ondersteund door forensisch-patholoog Frank van der Vliet die zich eveneens in de zaak heeft verdiept en aandrang voor reconstructie. Volgens de patholoog lijkt de lezing dat de jongen met een dekbedhoes aan een gordijnrail heeft verhangen. Het is een moeilijk uitvoerbaar. "Ik wil graag de situatie nabootsen om te zien of er genoeg reden om er nog eens naar te kijken."

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, heeft Van de Goot ingevraagd nader onderzoek te verrichten naar het overlijden. "De nabestaanden willen onder andere antwoord op de vraag hoe de striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksels zijn ontstaan of er kort voor zijn dood geweld op hem is toegepast."

Beleid schoot tekort

De Inspecties van Jeunzorg en Gezondheidszorg constateerden dit voorjaar d




▲ © ANP, inzet Anass

Familie Anass weet zeker dat hij is vermoord

De 13-jarige Anass Aouragh stuurde op woensdagmiddag 6 februari, enkele uren voordat hij als vermist werd opgegeven, drie e-mails naar zijn docenten. Daarin vroeg hij om extra lessen, omdat hij graag voldoende wil halen. 'Zoiets doe je niet als je van plan bent zelfmoord te plegen', zegt Anass' halfzuster Yasmin (19)

Vragen over motieven

- Achtergrondinformatie verkrijgen (medisch & sociaal)
- Waren er waarschuwingstekenen?
- Waren er ernstige gebeurtenissen in omgeving?
- Aanwijzingen voor recente onrust of stress?
- Belangen bij de dood ?
- Afscheidsnotities, Soc media & passende bij persoon?
- Kreeg de overledene professionele behandeling of VG?
- Eerdere suïcidepoging en zo welke?
- Zoekgeschiedenis (telefoon, PC etc)
- In de familie ooit suïcide?



Bij twijfel met wie overlegt u dan?



Indien tijd.....Casus II



- Man 47 jaar
- Alcohol afhankelijkheid
- Vg depressie en angststoornis
- Psychosociale problematiek
- Meerdere keren in beeld CD





- Sterft tgv “een ongeval” door verdrinking

- 2 maanden later gewezen op berichtgeving op FB

Afronding



Questions



• info@suicidaliteit.nl

• www.suicidaliteit.nl

• r.dewinter@parnassia.nl



- de Winter RF, de Groot MH, van Dassen M, Deen ML, de Beurs DP. [Suicidal behaviour and attempted suicide occurring during assessment by the outreach psychiatric emergency service](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2017;59(3):140-14
- Spuijbroek AT, Leezer YM, de Beurs DP, de Winter RF. [\[The proportion of suicides committed by patients with a mental health disorder for which treatment costs are now no longer reimbursed by health insurance\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2016;58(11):803-808
- Miedema N, Hazewinkel MC, van Hoeken D, van Amerongen AS, de Winter RF. [\[A study of the connection between coercive measures used in a closed acute psychiatric ward and the socio-demographic and clinical characteristics of the patients involved\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2016;58(6):434-45
- de Groot MH, de Winter RF, van der Plas W, Kerkhof AJ. [\[An evaluation of a new Dutch suicide prevention tool \(KEHR\): datadriven evaluation and learning\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2016;58(5):351-60. Dutch.
- de Winter RF. [\[A task force for confused people\]](#). *Ned Tijdschr Geneesk*. 2016;160:D55
- de Winter RF. [\[Reaction on 'Risk factors and protective factors relating to suicide in the Netherlands and Flanders'\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2016;58(4):342-3.
- de Beurs DP, de Groot MH, de Keijser J, van Duijn E, de Winter RF, Kerkhof AJ. [Evaluation of benefit to patients of training mental health professionals in suicide guidelines: cluster randomised trial](#). *Br J Psychiatry*. 2016 May;208(5):477-83
- de Beurs DP, Bosmans JE, de Groot MH, de Keijser J, van Duijn E, de Winter RF, Kerkhof AJ. [Training mental health professionals in suicide practice guideline adherence: Cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial](#). *J Affect Disord*. 2015 Nov 1;186:203-10
- de Beurs DP, de Groot MH, de Keijser J, Mokkenstorm J, van Duijn E, de Winter RF, Kerkhof AJ. [The effect of an e-learning supported Train-the-Trainer programme on implementation of suicide guidelines in mental health care](#). *J Affect Disord*. 2015 Apr 1;175:446-53
- de Beurs DP, de Groot MH, Bosmans JE, de Keijser J, Mokkenstorm J, Verwey B, van Duijn E, de Winter RF, Kerkhof AJ. [Reducing patients' suicide ideation through training mental health teams in the application of the Dutch multidisciplinary practice guideline on assessment and treatment of suicidal behavior: study protocol of a randomized controlled trial](#). *Trials*. 2013 Nov 6;14:372.
- Badloe JS, de Winter RF, Ramlal D, van Amerongen AS. [\[Manic-psychotic symptoms as clinical manifestation of hyperparathyroidism\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2013;55(8):635-9
- van Amerongen AS, Verheijden EE, van Gent NM, Moaddine N, de Winter RF, Blom JD. [Folie à famille: a Surinamese-Hindustani family with a shared paranoid delusion and severe undernourishment\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2013;55(2):123-7.
- Goekoop JG, de Winter RF, Wolterbeek R, Van Kempen GM, Wiegant VM. [Increased plasma norepinephrine concentration in psychotic depression](#). *Ther Adv Psychopharmacol*. 2012 Apr;2(2):51-63
- Goekoop JG, De Winter RF, Goekoop R. [An Increase of the Character Function of Self-Directedness Is Centrally Involved in Symptom Reduction during Remission from Major Depression](#). *Depress Res Treat*. 2011;2011:749640
- Goekoop JG, De Winter RF. [Temperament and character in psychotic depression compared with other subcategories of depression and normal controls](#). *Depress Res Treat*. 2011;2011:730295
- Bohnen EM, de Winter RF, Hoenkamp E. [\[Diagnostics with the MINI-plus in acute psychiatry\]](#). *Tijdschr Psychiatr*. 2011;53(4):239-44
- Goekoop JG, de Winter RF, Wolterbeek R, van Kempen GM, Wiegant VM. [Evidence of vasopressinergic-noradrenergic mechanisms in depression with above-normal plasma vasopressin concentration with and without psychotic features](#). *J Psychopharmacol*. 2011 Mar;25(3):345-52
- Goekoop JG, de Winter RF, Wolterbeek R, Spinhoven P, Zitman FG, Wiegant VM. [Reduced cooperativeness and reward-dependence in depression with above-normal plasma vasopressin concentration](#). *J Psychopharmacol*. 2009 Nov;23(8):891-7.
- de Winter RF, Wolterbeek R, Spinhoven P, Zitman FG, Goekoop JG. [Character and temperament in major depressive disorder and a highly anxious-retarded subtype derived from melancholia](#). *Compr Psychiatry*. 2007 Sep-Oct;48(5):426-3
- de Winter RF, Zitman FG, van Houwelingen JC, Wolterbeek R, Goekoop JG. [Anxious-retarded depression: relation to two-year outcome of major depressive disorder](#). *J Affect Disord*. 2006 Jan;90(1):77-81]